用藥指導單張

衛教小組 DM9910101

學　名：Ixekizumab

商品名：TALTZ INJ 80MG/1ML(健保事審)

中文名：達癬治注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. 斑塊性乾癬

治療適合接受全身性治療的中至重度斑塊性乾癬之成人患者。

2. 乾癬性關節炎

適用於治療患有活動性乾癬性關節炎之成人病人。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 斑塊性乾癬

應以皮下注射方式給予TALTZ。建議劑量為第0 週給予160 mg (兩劑80 mg 的注射劑)，接著於第2、4、6、8、10 與12 週投予80 mg，之後每4 週投予80 mg。

2. 乾癬性關節炎

建議劑量為第0 週以皮下注射方式給予160 mg (兩劑80 mg 的注射劑)，隨後每4 週投予80mg。同時患有中度至重度斑塊性乾癬之乾癬性關節炎病人，應採用斑塊性乾癬的建議劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常見注射部位反應為紅斑與疼痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

冷藏存放於攝氏 2° C 到 8° C之間。

如有需要，病人/看護者可存放 TALTZ 於攝氏30° C 以下的室溫最多 5 天，必須避光保存於原包裝盒內。

當 TALTZ 存放於室溫後，不可移至冰箱再冷藏，如 5 天內未開封使用需銷毀。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20