

用藥指導單張

衛教小組 DQ1570201

學名：Sorafenib

商品名：NEXAVAR★ 200MG (健保事審)

中文名：蕾莎瓦膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

轉移性或無法手術切除且不適合局部治療或局部治療失敗之晚期肝細胞癌 (HCC)。晚期腎細胞癌 (RCC) 且已接受 interferon-alpha 或 interleukin-2 治療失敗，或不適合以上兩種藥物治療之病患。放射性碘治療無效之局部晚期或轉移性的進行性 (progressive) 分化型甲狀腺癌 (DTC)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Nexavar 的每日建議劑量為一次 400 毫克 (2 顆 200 毫克錠劑)，一天服用 2 次，不與食物一起服用 (至少用餐前一小時或用餐後 2 小時)。口服使用，以水吞服。治療應持續直到病患無法再得到臨床效益或發生不可接受的毒性。

肝細胞癌及腎細胞癌的劑量調整方式

處理疑似藥物不良反應時，可能需要暫時中斷 Nexavar 治療及/或減少劑量。當必須要減少劑量時，Nexavar 的劑量應降至每天

400 毫克，若須進一步減少劑量，Nexavar 的劑量可以降至每隔一天 400 毫克。

分化型甲狀腺癌的劑量調整方式

處理疑似藥物不良反應時，可能需要暫時中斷 Nexavar 治療及/或減少劑量。當治療分化型甲狀腺癌的過程中必須要減少劑量時，Nexavar 的劑量應降至每天 600 毫克，分兩次服用 (2 錠 200 毫克及 1 錠 200 毫克，間隔 12 小時)，若須進一步減少劑量，Nexavar 的劑量可以降至 1 錠 200 毫克，一天兩次，接續可再降至 1 錠 200 毫克，一天一次。當非血液學的不良反應獲得改善後，可以增加 Nexavar 的劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

紅斑和出疹、腹瀉、噁心、疲倦。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ1570201

學名：Sorafenib

商品名：NEXAVAR★ 200MG (健保事審)

中文名：蕾莎瓦膜衣錠



六、此藥儲存時的條件為何？

30度C以下乾燥處儲存。藥品必須至於兒童無法觸及之處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師