


用藥指導單張

衛教小組 DQ14850101

學名：Paclitaxel (Nab-Paclitaxel)

商品名：ABRAXANE ★ 100MG

中文名：亞伯杉注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. 轉移性乳癌

ABRAXANE 於以合併化療治療轉移疾病失敗之乳癌。除非臨床上禁，否則先前治療應包含一種anthracycline。

2. 非小細胞肺癌

對於無法手術或放射治療的患者，ABRAXANE併用carboplatin，做為局部晚期或轉移性非小細胞肺癌之第一線治療。

3. 胰腺癌

ABRAXANE合併gemcitabine，做為轉移性胰腺癌患者之第一線治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

由於可能發 管滲漏，建議給藥期間密切監測輸注部位是否發 外滲情況。依說明，將ABRAXANE輸注時間限制在30分鐘內，可減少輸注相關反應。

1. 轉移性乳癌

對於轉移性乳癌以合併化療失敗，ABRAXANE之建議 法為每3週 次，以30分鐘靜脈注射260mg/m²。

2. 非 細胞肺癌 A

BRAXANE之建議劑量為每21天療程的第1、8、15天，以30分鐘靜脈輸注100 mg/m²。Carboplatin僅在每21天療程的第1天施 ABRAXANE之後立即開始。說明：在ABRAXANE 於非 細胞肺癌之臨床試驗中，Carboplatin之 標劑量為每次AUC= 6 mg•min/mL。

3. 胰腺癌

ABRAXANE之建議劑量為每28天療程的第1、8、15天，以30-40分鐘靜脈輸注125mg/m²。Gemcitabine之建議劑量為1000 mg/m²，在每28天療程的第1、8、15天，施 ABRAXANE之後立即開始以30-40分鐘靜脈輸注。

三、使用時我該注意的特別事項？

骨髓抑制(主要為嗜中性 球減少) 為ABRAXANE之劑量相關及劑量限制(doselimiting)的毒性。臨床試驗中，34%轉移性乳癌 (MBC) 病、47%非 細胞肺癌(NSCLC) 病 及38%胰臟癌病 發 第3-4級嗜

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DQ14850101

學名：Paclitaxel (Nab-Paclitaxel)

商品名：ABRAXANE ★ 100MG

中文名：亞伯杉注射劑



中性 球減少。應頻繁監測全 球計數，以瞭解骨髓毒性，包括第1天給藥前（轉移性乳癌），及第1、8、15天給藥前（非 細胞肺癌及胰臟癌）。基線絕對嗜中性 球計數（ANC）低於1,500cells/mm³的病，不應施 ABRAXANE。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

副作用嗜中性 球減少、疲倦、周邊神經病變、噁、禿髮、周邊腫、腹瀉、發熱、食慾減退、嘔吐、出疹、脫。

六、此藥儲存時的條件為何？

安定性

未拆封的ABRAXANE藥瓶，以原始包裝存放在30° C以下，在包裝標期之前應可維持安定。冷凍或冷藏不會對產品安定性產生不良影響。

藥瓶中已配製懸浮液之安定性

藥瓶中已配製之ABRAXANE應立即使，必要時可在2° C - 8° C冷藏最多24 時。

靜脈輸注袋中，已配製懸浮液之安定性

靜脈輸注袋中已製備之輸注懸浮液應立即使，在避光環境下可於2° C - 8° C最多貯存24 時。

瓶中與靜脈注射袋中配製後的ABRAXANE在冷藏儲存時間總和為24 時。後續靜脈輸注袋於室溫（約25° C）和光照環境最多貯存4 時。未使 部分請棄置。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師