

用藥指導單張

衛教小組 DL14120101

學名：Quetiapine

商品名：QUEPINE 100MG

中文名：瑰樂平膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

思覺失調症、雙極性疾患之躁症發作。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Quetiapine 每天服 兩次，與或不與食物併服均可。

成

思覺失調症：

治療前四天之每 劑量為第一天 50 mg，第二天 100 mg，第三天 200 mg，第四天 300 mg。第四天以後，劑量應逐漸調整 每 300~450mg 的 般有效劑量。依個別病的臨床反應及對藥物的耐受性，每 劑量範圍通常在 150~750 mg 間。

雙極性疾患之躁症發作：

作為單 療法或作為情緒穩定劑的輔助治療。治療前四天之每 劑量為第一天 100 mg，第二天 200 mg，第三天 300 mg，第四天 400 mg。劑量可依個別病的臨床反應及對藥物的耐受性在每 200~800 mg 之間加以調整，一 般有效劑量在每 400~800mg 的範圍之間。

老年

Quetiapine 如同其他的抗精神病藥物 般，老年 服 時應該特別 ，特別是在最初的服 階段。老年病 剛開始服 Quetiapine 的劑量，應為每 25 mg。劑量應該每 增加 25~50 mg， 達到有效劑量為 。但老年病 的有效劑量可能較年輕病 為低。

孩童及青少年

本品未核准使 於兒童及青少年。Quetiapine 不適 於 18 歲以下的兒童及青少年。

三、使用時我該注意的特別事項？

可能造成嗜睡，因此病人操作具危險性的機器，包括駕駛汽車在內應特別小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL14120101

學名：Quetiapine

商品名：QUEPINE 100MG

中文名：瑰樂平膜衣錠



五、此藥會造成什麼副作用？

嗜睡、頭暈、口乾。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師