用藥指導單張

衛教小組 DG2190101

學　名：Sildenafil

商品名：VIAGRA 100MG(自費)

中文名：威而鋼膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

1. 輕度血管性陽萎。2. 神經性陽萎。3. 心因性陽萎。4. 混合性的勃起功能障礙。5. 糖尿病引起的性功能障礙。

成年男性勃起功能障礙。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 對於大部份的病人說，建議以50mg開始服用，視反應可增加為100mg，或減少為25mg。
2. 下列病人宜以25mg開始，大於65歲病人，肝硬化的病人，腎功能不好的病人，或併服紅黴素或抗黴菌藥物的病人。
3. 病人最好在空腹或清淡食物後服用，每天限服一顆，服藥後平均1小時後會發生功能，有些病人20～40分就有作用，一般而言，服藥後30分～4小時是最適合進行性生活的時間。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 病人若有心悸或嚴重不適，應即刻求醫。
2. 少數病人會有暫時性藍綠光乍現，因此最好避免開車。
3. 最大容忍劑量800mg。
4. 如果服用硝化甘油類的心臟病藥又同時服用本品，可能使血壓突然下降，而造成致命的昏迷或休克。
5. 長期服用本品可能形成心理上的依賴，一旦沒有服藥就無法勃起。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：　在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02

用藥指導單張

衛教小組 DG2190101

學　名：Sildenafil

商品名：VIAGRA 100MG(自費)

中文名：威而鋼膜衣錠



五、此藥會造成什麼副作用？

(1)10%的病人會感覺頭暈或頭痛。(2)3%會有短暫性的視力問題，如視力模糊，或看到藍色或綠色的光暈。(3)血壓突然下降，若與硝化甘油等治療心臟病的藥物併用，可能造成昏迷或休克。(4)胃腸不適、噁心、嘔吐。(5)臉潮紅。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02