

用藥指導單張

衛教小組 DB5280301

學名：Cetirizine

商品名：CETIRIZINE ORAL SOL'N 1MG/ML, 60ML

中文名：勝克敏液



一、此藥品的用途是什麼？

季節性鼻炎、過敏性鼻炎、結膜炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

3歲以上孩童適用。

3-6歲孩童：一天一次，每次 5 毫克(即5ml)，於晚餐時服用。或分別於早、晚各服用2.5毫克(即2.5ml)。

6歲以上：每次10毫克(即10ml)，一天一次，於晚餐時與液體伴服。

腎功能不全的患者服用本藥時，其劑量應減半。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 在治療劑量下，Cetirizine不會加重酒精(血中酒精濃度為0.8g/L時)作用，但應避免。

2. 動物實驗上，尚無引起畸型胎之報告，但懷孕及哺乳的婦人請謹慎使用。

3. 至今尚未有藥物交互作用方面的報告，但若同時服用安眠藥者，請謹慎使用。

4. 實驗證明，對正常人投予20~25mg/天的劑量，不會影響正常的睡眠及活動時間。但從事駕駛及操作機械者，請小心使用，儘量不要過量服用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

曾有報導顯示會發生輕微、短暫的主觀性副作用，例如：頭痛、眩暈、嗜眠、精神激昂、口乾、胃腸不適。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DB5280301

學名：Cetirizine

商品名：CETIRIZINE ORAL SOL'N 1MG/ML, 60ML

中文名：勝克敏液

食用。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師