用藥指導單張

衛教小組 DA12710101

學　名：Nicardipine

商品名：HOLDIPINE 20MG/20ML(高劑量)

中文名：欣立定注射液



一、此藥品的用途是什麼？

適用於當口服治療不可行或不合適時，對高血壓的短期處置。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人之起始劑量：

3-5mg/h 持續輸注15分鐘，劑量可以0.5或1mg每15分鐘之輸注速率逐漸調高，但最大不超過15mg/h；維持劑量：達到治療目標時，應緩慢降低劑量，通常以2-4mg/h維持治療效果。

老年/孕婦/肝腎功能不良者：

依據病人血壓及臨床情況，起始劑量為1-5mg/h，持續輸注30分鐘後，視實際治療效果，劑量可以0.5mg/h 逐漸調高或降低，但最大不超過15mg/h。

小兒：

對早產兒、新生兒、乳幼兒、小兒及兒童之安全性及有效性尚未確立。本藥之靜脈輸注應僅使用於小兒患者於重症加護或手術後危急生命之高血壓。

起始劑量： 在危急情況 下，建議起始劑量為 0.5-5 mcg/kg/min。建議維持劑量：1-4 mcg / kg /min。 本藥靜脈輸注使用於腎功能不良小兒應謹慎小心，且應使用最低劑量。

手術時異常高血壓的緊急處置

本藥係以生理食鹽液或5%葡萄糖注射液稀釋成 Nicardipine的 0.01~0.02% (1 mL相當於 0.1~0.2 mg)溶液，作靜脈輸注。起初，以每分鐘、每公斤體重相當於2~10 mcg的輸注速率(2~10 mcg/kg/min)投與，使血壓下降至期望值，然後再依血壓偵測來調節輸注速率，若有使血壓急速下降的必要時，則直接使用本藥，以每公斤體重相當於 Nicardipine 10~30 mcg(10~30 mcg/kg)之劑量，作靜脈內投與。

高血壓性緊急症

本藥係以生理食鹽液或 5%葡萄糖注射液稀釋成 Nicardipine的 0.01~0.02% (1 mL相當於 0.1~0.2 mg)溶液，作靜脈輸注。此時，以每分鐘、每公斤體 重相當於 0.5~6 mcg的輸注速率投與，起初，以每分鐘每公斤體重 0.5 mcg 的輸注速率(0.5 mcg/kg/min)投與，使血壓下降至期望值，然後再依血壓偵測來調節輸注速率。

三、使用時我該注意的特別事項？

(1) 對於高血壓性緊急症患者，如果達到期望的血壓後仍須控制血壓，而且口服給藥可 行，則應改用口服藥物。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

用藥指導單張

衛教小組 DA12710101

學　名：Nicardipine

商品名：HOLDIPINE 20MG/20ML(高劑量)

中文名：欣立定注射液



(2) 對於高血壓性緊急症患者，曾有報導指出，停用本藥後血壓可能會再度升高。因此，本藥應以逐步減少劑量的方式停藥，停用本藥後應謹慎控制血壓。改為口服治療後，應留意血壓可能會升高。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

偶爾有噁心，嘔吐，心悸，頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

請密封儲存於 25℃以下，毋須冰存並避免陽光直射。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20