

用藥指導單張

衛教小組 DM5120201

學名：Megestrol

商品名：MEGEST ORAL SUSP. 40MG/ML (120ML)

中文名：麥格斯口服懸液劑



一、此藥品的用途是什麼？

後天免疫缺乏症候群患者的厭食症，惡病體質或原因不明的體重明顯減輕。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人起始建議劑量為400–800mg/天。

使用前應將容器振搖均勻。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 使用本品治療體重減輕之前，必須先找出可治療的體重減輕原因。這些原因包括可能的惡性並、全身性感染、影響吸收的腸胃道疾患、內分泌疾病及腎臟或精神病。

2. 有血栓性栓塞疾病病史的患者應謹慎使用。

3. 報告指出糖尿病惡化，胰島素需求量增加與麥格斯口服懸液劑有關。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

陰道出血、乳房壓痛、頭痛、食慾增加、體重增加、腹痛、噁心、嘔吐、深部靜脈栓塞、過敏。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師