用藥指導單張

衛教小組 DL10100101

學　名：Amisulpride

商品名：MISUL 200MG

中文名：美贊錠



一、此藥品的用途是什麼？

思覺失調症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
如果本藥的每日劑量低於400mg，則每日單次給藥即可。然而，如果每日劑量高於400mg，則應分兩次投藥。

以負性症狀為主要表現者：

建議劑量為50~300mg/day。然而，應該依照病患個人的需要及臨床反應，調整至最低有效劑量。一般較適宜的劑量約100mg/day。

其病徵包括活性及負性症狀者：

治療初期的劑量以能控制活性症狀為目的，約為400~800mg/day，然後再根據病人的反應，調整至最低有效劑量。

急性精神病症：

治療初期：

在開始治療的首幾天，可以肌肉注射給藥，其最高劑量為400 mg/day，之後再改為口服給藥。口服建議劑量為400~800mg/day；最高劑量勿超過1200 mg/day。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用，切勿擅自增減藥量或停藥，並請按時回診

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

失眠、焦慮、激燥不安。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02