

用藥指導單張

衛教小組 DE14270101

學名：Dapagliflozin+Metformin

商品名：XIGDUO XR 10MG/1000MG

中文名：釋多糖持續性藥效膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

適用於配合飲食和運動，以改善以下第二型糖尿病成人病人的血糖控制：已在接受dapagliflozin 和metformin hydrochloride (HCl) 合併治療者，或使用metformin但控制不佳者。

用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病 (CVD) 或多重心血管風險因子的成人病人時，dapagliflozin可降低心衰竭住院的風險。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 醫師應根據患者目前的治療個別訂定XIGDUO XR的起始劑量。
2. XIGDUO XR應該每天服用一次，於早晨與食物併服，採漸進方式調高劑量，以減少metformin引起的胃腸副作用。
3. XIGDUO XR錠必須整粒吞服，切勿磨碎、切割或嚼碎。
4. XIGDUO XR錠中無活性的成分有時會以柔軟的含水塊狀物從糞便中排出，形狀類似原錠。
5. 劑量可根據有效性和耐受性調整，但不可超過dapagliflozin 10 mg和metformin HCl 2000 mg的每日最大建議劑量。
6. 原先在晚上服用 metformin XR 的患者，應先跳過最後一次劑量，再開始服用XIGDUO XR。
7. 用於血容量不足 (Volume depletion) 的患者，建議開始XIGDUO XR前先矯正這種情況。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 建議在開始本品治療之前並在使用期間定期評估腎功能。
2. 有肝功能不全、酒精中毒或心衰竭病史的患者，或計畫接受動脈注射含碘顯影劑的患者，在進行血管內注射含碘顯影劑的放射性檢查時或檢查前都要先暫停XIGDUO XR治療，等到檢查後 48 小時重新評估eGFR，確定腎功能穩定後，方可重新開始服藥。
3. XIGDUO XR不建議用於肝功能不全患者。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DE14270101

學名：Dapagliflozin+Metformin

商品名：XIGDUO XR 10MG/1000MG

中文名：釋多糖持續性藥效膜衣錠



低血壓、腎功能異常、泌尿道生殖系統黴菌感染、低血糖。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於30° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師