

用藥指導單張

衛教小組 DA8960301

學名：Digoxin

商品名：LANOXIN★ 0.5MG/2ML (注射)

中文名：隆我心注射液



一、此藥品的用途是什麼？

心臟衰竭、心房撲動、心房纖維顫動、陣發性心室性心搏過速。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 毛地黃著效劑量：口服：成人：迅速的一開始時0.5~0.75mg，接著每6~8小時1次，每次0.25~0.5mg，直到總劑量為1~1.5mg，緩慢的一每天0.125~0.25mg，連續7天。孩童：新生兒—每公斤40~60mcg；1個月至2歲者每公斤60mcg。
2. 維持劑量：口服/靜注：成人—每天0.125-0.5mg (平均劑量每天0.25mg)。小孩—為毛地黃著效劑量的20%-30%。
3. 注射劑量約為口服劑量的80%。靜脈投藥為最佳方式。肌肉注射並無優點，反而會引起注射部位疼痛。注射劑不稀釋或以注射用水、生理食鹽水、5%葡萄糖溶液、lactated Ringer's溶液稀釋4倍後，注射時間至少5分鐘以上。稀釋倍數不足時會引起沉澱。稀釋後要立即使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 老年人：Digoxin主要由腎臟排泄，老年人的腎功能衰弱，因此可能需要減少維持劑量。
2. 生體相等性：雖然新上市的藥品應將生體可用率的差異降至最低，但在更換廠牌或使用不同劑型時應特別小心監測臨床反應。
3. 毛地黃中毒症狀包括厭食、噁心、嘔吐、腹瀉或視力紊亂，宜小心。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 常見-噁心；2. 偶有-疲憊、頭痛、顏面神經痛、精神沮喪、幻覺、困倦、低血壓、視力障礙、厭食、嘔吐、腹瀉、發汗、吞嚥困難；3.

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DA8960301

學名：Digoxin

商品名：LANOXIN★ 0.5MG/2ML (注射)

中文名：隆我心注射液



嚴重者-AV阻斷。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師