

用藥指導單張

衛教小組 DG13970101

學名：Darolutamide

商品名：NUBEQA ★ 300MG (健保事審)

中文名：諾博戈膜衣錠

需補藥品
圖片

一、此藥品的用途是什麼？

1. 治療非轉移性的去勢抗性前列腺癌 (nmCRPC) 的病人。
2. 與docetaxel併用於治療轉移性的去勢敏感性前列腺癌 (mCSPC，又稱 mHSPC) 的病人。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

劑量療程

nmCRPC and mCSPC

建議劑量為每服兩次，每次服 600mg darolutamide (兩錠300 mg膜衣錠)，每總劑量相當於1200 mg darolutamide。

建議與食物併服並吞服整顆藥錠。

應持續使 NUBEQA直到疾病惡化或出現不可接受的毒性 接受NUBEQA治療的病還應同時接受黃體化激素釋放激素 (LHRH) 類似物或應進 雙側睪丸切除術。

三、使用時我該注意的特別事項？

在使 darolutamide治療期間使 強效CYP3A4和P-gp誘導劑可能會降低darolutamide的中濃度，除非沒有替代治療，否則不建議使。
應考慮選擇 種較不可能誘導CYP3A4或P-gp的替代併 藥物。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

皮疹、便秘、食慾不振、出、體重增加與 壓。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於30° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師