

用藥指導單張

衛教小組 DE0290101

學名：sitagliptin 50mg, metformin 500mg

商品名：januMET 50/500MG

中文名：捷糖穩



一、此藥品的用途是什麼？

適用於配合飲食和運動，以改善下列第二型糖尿病患者的血糖控制：
已在接受sitagliptin和metformin合併治療者；或僅使用sitagliptin和metformin但控制不佳者；或已使用metformin與sulfonylurea合併治療，但控制不佳者；或已使用metformin與PPAR促進劑合併治療，但控制不佳者；或已使用metformin與胰島素合併治療，但控制不佳者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

JANUMET的抗糖治療劑量應依據病個化，但不超過sitagliptin最每前所接受的治療、有效性及耐受性予以建議劑量100毫克以及metformin 2000毫克。

JANUMET通常以每兩次與食物併服的方式投予，漸進地提劑量，藉以降低metformin的胃腸道(GI)副作用。

腎功能不全之使建議：

開始使JANUMET之前應先評估腎功能，之後亦應定期評估。

JANUMET禁於eGFR <30 mL/min/1.73 m²的病（參禁忌欄及注意事項欄）。

JANUMET不建議使於eGFR ≥30 mL/min/1.73 m² <45 mL/min/1.73 m²的病，因為這些病需要降低sitagliptin的劑量，沒有相應劑量的JANUMET複市售產品。

三、使用時我該注意的特別事項？

JANUMET不可於第一型糖尿病病或於治療糖尿病酮酸症。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

腹瀉、噁心、嘔吐、頭痛、乏力等症狀。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DE0290101

學 名：sitagliptin 50mg, metformin 500mg

商品名：januMET 50/500MG

中文名：捷糖穩

不可超過30℃。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師