

用藥指導單張

衛教小組 DM11940101

學名：Terbinafine

商品名：TERFUNG 250MG

中文名：黴星平錠



一、此藥品的用途是什麼？

甲癬、髮癬，嚴重且廣泛且經局部治療無效的皮膚黴菌感染。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本藥須由醫師處方使用。治療時間依感染型態及嚴重度而定。

兒童：

在二歲以下的小孩，沒有足夠資料顯示可以使用。（通常<12公斤）小孩體重<20公斤，62.5毫克，一天一次。小孩體重20-40公斤，125毫克，一天一次。小孩體重>40公斤，250毫克，一天一次。

成人：

一天一次250毫克。治療時間：

1. 皮膚感染：足癬(踢間性、厚皮性)：2-6星期 體癬、股癬：2-4星期 皮膚念珠菌感染：2-4星期。 感染之徵兆與症狀可能不會於黴菌治癒數週後完全消除。
2. 頭皮、毛髮的感染：髮癬：4星期，髮癬主要發生於小孩身上。
3. 甲癬(灰指甲)：大部份的病人，須使用6~12星期的治療程。手指甲甲癬(灰指甲)：大部份需要治療6星期。腳趾甲甲癬(灰指甲)：大部份需要治療12星期。

老年人：

沒有證據顯示老年人的劑量須不同於年輕病人的劑量，但老年人要服用Terbinafine時，必須考慮到原先已有腎或肝功能障礙的情況。

小孩： 2歲以下，沒有口服Terbinafine的經驗，因此不建議使用。

肝或腎功能障礙者：穩定且慢性肝或腎功能異常的病人(肌胺酸酐廓清率小於50公撮/每分鐘或血清肌胺酸酐大於300微莫耳/公升。) 應使用建議劑量的一半。此類病人並應在用藥前後追蹤檢查其肝功能。

三、使用時我該注意的特別事項？

Terbinafine用於嚴重且廣泛並經局部外用治療無效的皮膚黴菌感染時，限由皮膚科專科醫師處方使用。口服Terbinafine須只用在外用治療無法使用時。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DM11940101

學名：Terbinafine

商品名：TERFUNG 250MG

中文名：黴星平錠



驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

飽脹、噁心、消化不良、輕度腹痛、腹瀉、沒有胃口。

六、此藥儲存時的條件為何？

25°C 以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師