用藥指導單張

衛教小組 DA7060201

學　名：Levosimendan

商品名：SIMDAX ★ 12.5MG/5ML(自費)

中文名：心得適濃縮注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

短期治療因傳統治療方式無效且適用強心劑治療之急性失代償性慢性心衰竭。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

使用方法：

僅供周邊靜脈或中央靜脈點滴輸注用，使用前必須稀釋。

投與劑量：

應依病人的個別臨床狀況與反應來決定治療劑量與時間。

給藥時，應先給予起始劑量6-12微克/公斤靜脈輸注超過10分鐘，接續以0.1微克/公斤/分鐘的劑量連續輸注。

稀釋後：

稀釋後的藥品，其化學及物理安定性於25° C下可維持24小時。然而，從微生物觀點考量，本藥品應立即使用。若未能立即使用，則其儲存時間及儲存狀態為使用者之責任，但通常應於2-8° C下24小時內須使用完畢，除非稀釋過程為嚴密控制且具確效的無菌狀態下執行。

三、使用時我該注意的特別事項？

本品與靜脈血管擴張劑(vasodilator)或強心劑(inotrope)併用之經驗不多，由於vasodilator和dobutamine可能降低血壓，且本品之初始血液動力學作用也會降低心臟收縮壓和舒張壓，由此不建議本品與這些藥品併用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

心室性心跳過速、頭痛、低血壓。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 請儲存於2-8℃之冰箱中。請勿冷凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.14

用藥指導單張

衛教小組 DA7060201

學　名：Levosimendan

商品名：SIMDAX ★ 12.5MG/5ML(自費)

中文名：心得適濃縮注射劑



2. 在儲存期間濃縮液的顏色可能會變成橘色，但不會減低藥效。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.14