


用藥指導單張

衛教小組 DN15310101

學名：Ketorolac

商品名：KETO 30MG (注射)

中文名：克多炎注射液



一、此藥品的用途是什麼？

短期（ ≤ 5 天）使用於緩解無法口服病人之中重度急性疼痛，通常使用於手術後。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本藥可經由靜脈或肌肉注射投與，靜脈注射時間不得低於15秒，肌肉注射應採緩慢及深部投與。

一般之鎮痛作用可於投藥後30分鐘內顯現，而最大效果也可於投藥後1~2小時內出現，其鎮痛作用可持續4~6小時【前述資料常隨投藥途徑及劑量之不同而有所差異】。

單劑量療法：

肌肉注射—65歲以下，每次60mg；65歲及65歲以上，腎功能不全及體重低於50kg者，每次30mg。

靜脈注射—65歲以下，每次30mg；65歲及65歲以上，腎功能不全及體重低於50kg者，每次15mg。

重覆給藥療法（靜脈或肌肉注射）：65歲以下，每次30mg，每6小時一次，最高日劑量不得超過120mg。

65歲及65歲以上，腎功能不全及體重低於50kg者，每次15mg，每6小時一次，最高日劑量不得高於60mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

心血管栓塞事件：

1. NSAIDs藥品會增加發 嚴重 管栓塞事件之風險，包括 心肌梗塞和中風，且可能為致命的。此風險可能發 在使 該類藥品的初期，且使 藥品的時間越長，風險越 。

2. 進 冠狀動脈繞道 術(Coronary artery bypass graft, CABG)之後14天內禁 本藥。

本藥忌用於椎管內與硬膜外給藥。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DN15310101

學名：Ketorolac

商品名：KETO 30MG (注射)

中文名：克多炎注射液



D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

本藥品投與後，應留意是否有胃腸潰瘍出血及穿孔，手術後出血，急性腎衰竭，無防禦性反應及肝衰竭等現象發生。

其他較常見不良反應如下：

1. 全身：偶有水腫現象、
2. 心血管系統：偶有高血壓、
3. 胃腸系統：偶有噁心、消化不良、胃痛、便秘、下痢、腹脹、嘔吐及口內炎等症狀、
4. 血液及淋巴系統：偶有紫斑病、
5. 神經系統：偶有嗜眠、眩暈、頭痛及發汗等症狀、
6. 皮膚：可能會出現發疹、搔癢感等、
7. 其他：視覺遲鈍、喉痛。
8. 重覆注射偶有引發注射部位疼痛現象。

六、此藥儲存時的條件為何？

於25℃以下、避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師