


用藥指導單張

衛教小組 DC9650101

學名：Phenobarbital

商品名：PHENOBARBITAL 30MG (管藥四)

中文名：苯巴比特魯錠



一、此藥品的用途是什麼？

癲癇。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一般成人劑量：

抗痙攣劑或運動失調劑—口服，一天3~6 錠(100~200mg)，睡前1次服用或平均分成3 次服用。

安眠劑—口服，3~6 錠(100~200mg)睡前服用。

肝臟原漿微粒酶誘生劑—口服，1~2 錠(30~60mg)，一天3次。

鎮靜劑—口服，1/2~1 錠(15~30mg)，一天2~3次。

一般兒童劑量：

抗痙攣劑或抗運動失調劑—口服，每公斤體重3~5mg 或每平方公尺體表面積125mg，睡前一次服用或平均分成3次服用。

安眠劑—依個別病人而定，由醫師指示之。

肝臟原漿微粒酶誘生劑—新生兒：口服，每公斤體重5~10mg。

12 歲以下孩童：口服，每公斤體重1~4mg，一天3次。

鎮靜劑—口服，每公斤體重2mg 或每平方公尺體表面積60mg 一天3 次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 病人若對其他巴比妥類過敏，對本藥亦可能產生過敏。
2. 本藥會通過胎盤障壁，若於懷孕後期或分娩時使用，可能對新生兒(特別是早產兒)引起呼吸抑制，此乃由於其肝功能尚未成熟之故。
3. 懷孕期使用時，由於會降低維生素K—依賴性凝血因素之量，而引起新生兒出血(維生素K 為新生兒之凝血因子)。
4. 當孕婦長期使用時，會產生身體依賴性，對新生兒則產生斷癮症狀。
5. 用本藥作為懷孕期的抗驚厥劑使用，會增加出生缺陷的發生率，應就其使用上之危險與效益加以考慮。
6. 本藥會排泄乳汁中，故哺乳之婦女使用本藥時，對嬰兒會引起中

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DC9650101

學名：Phenobarbital

商品名：PHENOBARBITAL 30MG (管藥四)

中文名：苯巴比特魯錠



樞神經系統抑制。

7. 年老及體弱之病人對一般劑量可能產生興奮、錯亂或抑制，故應使用較低劑量。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

投用本藥如有下列副作用時應加留意：

精神錯亂、精神抑制、呼吸短促或困難、皮膚發疹、眼瞼、面部或唇部腫脹、哮喘或胸口緊迫(過敏反應)、喉痛及發燒、異常出血或瘀傷、異常興奮、異常疲勞無力、心搏異常遲緩(CNS 抑制)及眼或皮膚變黃(肝功能異常)。如有笨拙或不安、暈眩、睏睡、腹瀉、頭痛、關節或肌肉痛、噁心、嘔吐及說話不清等症狀持續時，也應特別注意。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25℃以下乾燥且孩童不易取得處所。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師