用藥指導單張

衛教小組 DA4740201

學　名：Imidapril

商品名：TANATRIL（心血管用藥）10MG

中文名：田納滋錠



一、此藥品的用途是什麼？

高血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
起始劑量為每天一次，每次 5 mg。第一次給藥可選在睡前，以避免血壓突然下降。老人或肝腎功能不佳的患者，建議起始劑量為每天一次，每次 2.5 mg。通常維持劑量為每天 10 mg，若需要可增至每天 20 mg，老年人最大劑量為每天 10 mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本品於投與後，特別是下述患者在初次投與時，曾經產生暫時性的急速血壓下降，所以投與時應自低劑量開始，並於增量時徐徐進行，同時仔細觀察患者之狀態：重症高血壓的患者；接受血液透析中的患者；利尿降壓劑投與中的患者(特別是最近才開始投與利尿降壓劑之患者)；嚴重限制食鹽攝取之患者
2. 很少會出現伴隨有呼吸困難的顏面、舌頭、聲門或喉頭腫脹症狀的血管性浮腫，如發現此種異常時應立即停止投與，並作適當之處置。
3. 服用angiotensin轉換酵素抑制劑之患者使用dextran cellulose sulfonate經由吸著器進行apheresis時曾發生過休克現象，所以對於這些接受apheresis之患者切勿投與。
4. 服用angiotensin轉換酵素抑制劑之患者使用acrylonitrile methallyl sulfonate sodium膜(AN69)進行透析之患者切勿投與。
5. 因為降壓作用有時會導致頭暈、蹣跚，所以在高處作業或操作危險的機器例如駕駛汽車時 ，須特別注意。
6. 手術前24小時不建議投與。
7. 下列患者應慎重投與：

a. 有嚴重腎機能障害之患者(因有血中濃度升高之虞，所以血清肌酸酐值在3mg/dL以上時，應將劑量減少或投與間隔延長等，慎重投與之)。

b. 有兩側性腎動脈狹窄之患者：(有腎機能下降之虞)。

c. 高齡者。

8. 高齡者之投與：應自低劑量(例如2.5mg)開始投與，邊觀察患者之

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03

用藥指導單張

衛教小組 DA4740201

學　名：Imidapril

商品名：TANATRIL（心血管用藥）10MG

中文名：田納滋錠



狀態邊慎重投與之。

a. 本品主要由腎臟排泄，但因高齡者大多數腎機能降低會延遲本品自腎臟清除，血中濃度有持續維持在高濃度之虞，所以易於發生副作用或作用增強。

b. 高齡者一般來說不宜過度降低血壓(有引起腦梗塞之虞)。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級： 在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

很少發生血管性浮腫，急性腎衰竭；若發現異常時應停止投與並作適當之處置。其他副作用包括：

1. 偶有紅血球、血紅素、血球容積比、血小板數目減少，嗜酸球增加等，而很少有白血球減少之情形。
2. 腎臟：偶有蛋白尿、BUN、肌酸酐上升等情形。
3. 精神神經系統：偶有頭痛、頭暈、蹣跚、站立性頭暈等情形。
4. 循環器：偶而會出現心悸、低血壓。
5. 消化器：偶有噁心、嘔吐、胃部不適、腹痛等情形。
6. 肝臟：偶有GOT、GPT、AIK-P、LDH、總膽紅素上升等情形。
7. 過敏症：偶有發疹、瘙癢，此時應停止投與。
8. 其他：偶而會出現咳嗽、咽頭不適、不快感、倦感感、顏面潮紅、血清鉀濃度上升，而很少有浮腫之情形。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03