用藥指導單張

衛教小組 DC10580101

學　名：Cladribine

商品名：MAVENCLAD 10MG(健保事審)

中文名：瑪威克錠

需補藥品圖片

一、此藥品的用途是什麼？

MAVENCLAD 適用於治療成年病人的復發型多發性硬化症(臨床上有發作，且前二年有二次復發者)(MS)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

劑量

MAVENCLAD 兩年間的建議累積劑量是3.5毫克/公斤，每年給予1.75 毫克/公斤為一次療程。每次療程包括2 個治療週，一個在第一個月的開始，一個在對應治療年份第二個月的開始。每個治療週為期4 或5 天，病人需依體重服用單日劑量10 毫克或20 毫克(一錠或兩錠)

給藥方式

1. MAVENCLAD 是口服使用，須搭配水吞服，不可咀嚼。MAVENCLAD 服用不受食物攝取影響。
2. 由於錠劑未包膜，從泡殼取出後應立即吞服，避免暴露置於檯面或給藥時間超出一般所需。如果錠劑置於檯面上，或者破裂或部分碎片從泡殼中灑出，必須徹底清洗相關區域。
3. 病人拿取錠劑時，雙手必須乾燥，事後應徹底清洗。

三、使用時我該注意的特別事項？

血液學監測 MAVENCLAD 的作用方式與淋巴細胞數量的減少密切相關，對淋巴球之影響為劑量相關(dose-dependent)。

必須確認淋巴細胞數量：

- 第1 年開始MAVENCLAD 治療前。
- 第2 年開始MAVENCLAD 治療前。
- 在每個治療年開始治療之後的第2 和第6 個月。如果淋巴細胞數量低於500cells/mm³，應主動監測直到數值再次回復。

感染

Cladribine 會降低身體的免疫防禦力，增加感染的可能性。在開始cladribine 治療之前，必須排除人類免疫不全病毒、結核病和肝炎的感染。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

用藥指導單張

衛教小組 DC10580101

學　名：Cladribine

商品名：MAVENCLAD 10MG(健保事審)

中文名：瑪威克錠

需補藥品圖片

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：　不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

淋巴球減少症及帶狀皰疹。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於25℃下，原始包裝內，以防受潮。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20