用藥指導單張

衛教小組 DM4290201

學　名：Clindamycin

商品名：TIDACT CAP 150MG

中文名：帝達黴素膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌及厭氣菌等具有感受性菌株所引起之感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人

每次150~300 mg，每6小時1次；較嚴重之感染，每次300~450 mg，每6小時1次。

兒童

以8~16 mg/kg/day分成3~4次服用；較嚴重之感染，以16~20 mg/kg/day分成3~4次服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

曾患胃腸疾病，尤其是結腸炎患者，應謹慎投與。若使用本藥期間發生下痢現象時，應停止用藥。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 偶有腹痛、食道炎、噁心、嘔吐及下痢現象。
2. 最常見之副作用為全身性輕度至中度之蕁痲疹。

六、此藥儲存時的條件為何？

於25℃以下、避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11