用藥指導單張

衛教小組 DM7900201

學　名：Flomoxef

商品名：fluMARin 1GM

中文名：氟黴寧靜脈注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

對本劑有感受性之下列病原菌所引起之嚴重感染:葡萄球菌屬、鏈球菌屬(腸球菌除外)、肺炎球菌、peptostreptococcus屬、Branhamella catarrhalis、淋菌、大腸菌、Klebsiella屬、Proteus屬、Influenzae菌、Bacteroides屬。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下:
通常成人1日1-2g(力價)，分二次以靜脈注射或點滴靜脈注射。通常小兒劑量以1日每公斤60-80mg計算，分三~四次以靜脈注射或點滴靜注投與。通常早產兒、新生兒以一次每公斤20mg再出升三天內一日2~3次，出生四天後一日3~4次以靜脈注射或點滴靜脈注射投與。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用，切勿擅自增減藥量或停藥，並請按時回診

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

休克、過敏、溶血反應、偽膜性腸炎、維生素K缺乏症。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26