用藥指導單張

衛教小組 DQ6830201

學　名：Irinotecan

商品名：INNOCAN ★ 100MG/5ML

中文名：癌可癒靜脈輸注濃縮液



一、此藥品的用途是什麼？

晚期性大腸直腸癌之第一線治療藥物：與5-FU及folinic acid合併，使用於未曾接受過化學治療之患者。單獨使用於曾接受5-FU療程治療無效之患者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

僅供成人使用。Irinotecan輸注溶液須注入周邊或中央靜脈。

單方藥物治療(已接受過化學治療之患者)

Irinotecan的建議劑量為350mg/m2，靜脈輸注30至90分鐘，每三週給藥一次。

合併藥物治療(未曾接受過化學治療之患者)

曾以下列給藥方式，評估Irinotecan與5-fluorouracil(5-FU)和folinic acid(FA)併用的安全性與療效： Irinotecan加5FU/FA，每二週給藥一次

Irinotecan的建議劑量為180mg/m2，每二週給藥一次，靜脈輸注30-90分鐘，然後輸注folinic acid和5-fluorouracil。

三、使用時我該注意的特別事項？

本藥不含抗菌防腐劑，Irinotecan溶液稀釋後必須立刻使用。在嚴格的無菌條件下進行配製與稀釋，則Irinotecan溶液在室溫下應於12小時內輸注完畢，或開封後儲存於2-8℃，而於24小時內輸注完畢。

靜脈輸注液之製備

用有刻度的針筒，以無菌技術從小瓶中抽取所需之Irinotecan注射液，注入250ml的0.9%氯化鈉溶液或5%葡萄糖溶液輸注袋或瓶中，然後用手旋轉之，使其充分混合。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級： 在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

延遲性腹瀉、噁心與嘔吐、脫水。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11

用藥指導單張

衛教小組 DQ6830201

學　名：Irinotecan

商品名：INNOCAN ★ 100MG/5ML

中文名：癌可癒靜脈輸注濃縮液



室溫 25℃以下，避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11