
用藥指導單張

衛教小組 DA0340101

學　名：Diltiazem

商品名：CARDIZEM 90MG(不可剝半)

中文名：凱帝心徐放錠



一、此藥品的用途是什麼？

狹心症、高血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1.狹心症:適當的起始劑量是1次90公絲，1日2次；可逐漸增加最高1天360公絲，1日2次服用。

2.高血壓:本品適當劑量範圍是1次90公絲到120公絲之間，1日2次；經過二個星期後，可逐漸增加到1天高達360公絲，1日2次服用。平常一日劑量範圍在一天240公絲至360公絲。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 根據動物實驗，本品有致腦畸形及胎死作用，故對孕婦或可能懷孕婦女，應禁忌使用。

2. 偶有GOT，GPT增高，黃疸、肝腫大。如出現這些症狀，即得馬上停藥。

本品係以一層不溶性多孔樣的聚合物，將Diltiazem包含在核心，聚合物內微粒化蔗糖溶解在胃酸時，就形成小孔，胃液經由小孔滲透進入核心，將Diltiazem溶解，使其以一定速率孺鞣X，結果可以得到一比較穩定的血中濃度，而持續更長的時間，因此能夠一天服用兩次來治療。此不溶性聚合物的白色外殼會完整的經腸胃道排出。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

1.一般副作用(>1/100):腳踝水腫，頭痛，眩暈，疲倦感，第一級房室傳導阻斷，噁心，便秘，發疹，搔癢，氨基轉移酶增加。

2.較少發生的副作用:心跳徐緩，蕁麻疹。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20


用藥指導單張

衛教小組 DA0340101

學　名：Diltiazem

商品名：CARDIZEM 90MG(不可剝半)

中文名：凱帝心徐放錠



食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20