

用藥指導單張

衛教小組 DA10590101

學名：Dipyridamole

商品名：sanDEL S.C. 50MG

中文名：心滴舒糖衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

對於慢性狹心症之治療可能有效。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 宜於空腹(飯前一小時或飯後兩小時)伴一大杯(240ml)水服用。吸收較快。為減少胃腸刺激，可於飯中或飯後服用。

2. 用量：慢性狹心症患者一次25mg，一日三次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 有傾向於低血壓的病人，本藥之使用應小心。

2. 本藥無法減輕急性心絞痛發作之痛楚，但有助於發作之防止及減少。

3. 本藥用於心絞痛之預防上，達到充分療效可能需時2-3個月。

4. 高達800mg之每日劑量曾被用於心瓣膜(Cardiac valvular)及腎臟外科手術後減少血小板之凝集。

5. 在使用口服抗凝血劑時，每日服用本藥高達400mg，不會影響到Prothrombin之活性及出血時間。

6. 投用本藥時，如從躺臥或坐姿起立時應加小心。

7. 用藥過多會發生周邊血管舒張，低血壓病患小心使用。

8. 本藥並不能阻止急性狹心症發作。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

在治療劑量下，本藥副作用通常是暫時且輕微。曾觀察到的副作用包括嘔吐、腹瀉及下列症狀如眩暈、噁心、頭痛、肌肉痛。長期以dipyridamole治療時，這些副作用通常會消失。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DA10590101

學名：Dipyridamole

商品名：sanDEL S.C. 50MG

中文名：心滴舒糖衣錠

室溫25℃儲存。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師