用藥指導單張

衛教小組 DM7530101

學　名：Acyclovir

商品名：virLESS（注射）250MG

中文名：剋疱凍晶注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

帶狀疱疹病毒及單純疱疹病毒引起之感染。預防骨髓移植及白血病所引起之免疫不全病人之單純疱疹感染。新生兒單純疱疹感染。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人劑量

1. 單純性疱疹（疱疹性腦炎例外）或水痘帶狀疱疹感染的患者，應每8小時，給予5mg/kg的Acyclovir輸注劑。 2. 免疫機能不全患者，但腎功能正常者，在治療水痘帶狀疱疹感

染時，應每8小時給予10mg/kg的Acyclovir輸注劑。免疫機能不全患者，但腎功能正常者，在治療水痘帶狀疱疹感染時，應每8小時給予10mg/kg的Acyclovir輸注劑。

兒童劑量

1. 3個月至12歲之間的兒童使用Acyclovir靜脈輸注時，應根據其體表面積計算劑量。患有單純性疱疹（疱疹性腦炎除外）或是水痘帶狀疱疹感染的兒童，應每8小時使用250mg/m2的Acyclovir靜脈輸注。

2. 免疫功能不全而腎功能正常的兒童，罹患水痘帶狀疱疹感染或是疱疹性腦炎時，應每8小時，給予500mg/m2體表面積的Acyclovir靜脈輸注。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 對使用較高劑量的患者（例如疱疹性腦炎），應特別注意其腎功能，特別是當患者有脫水或任何腎功能不全的現象時。

2. 配製後的Acyclovir注射液pH值約為11，不能經由口服給藥。 3. 使用於腎功能不全及老年患者：Acyclovir經由腎臟排除，因此在腎功能不全病人身上使用的劑量應該減少。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

注射部位局部發炎，噁心，嘔吐。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15

用藥指導單張

學　名：Acyclovir

商品名：virLESS（注射）250MG

中文名：剋疱凍晶注射劑



六、此藥儲存時的條件為何？

應貯存於25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15