

用藥指導單張

衛教小組 DA15400201

學名：Bisoprolol

商品名：BISOPROLOL (concor) 1.25MG

中文名：康肯膜衣錠1.25公絲



一、此藥品的用途是什麼？

穩定型慢性中度至重度心衰竭。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

病人必須在過去6週內無急性心衰竭發生，且在過去2週內無改變基本治療，即適當劑量ACE inhibitors（或於ACE inhibitors無法忍受下，使用其他血管擴張劑）和利尿劑、強心配醣體下，再併用bisoprolol。建議治療的醫師應是在治療心衰竭方面有經驗者。使用本品治療心衰竭，應由低劑量開始再逐漸增加劑量達最佳療效。調整依據如下列步驟：

- * 1.25mg 1天1次，使用1星期，病人適應良好下增加至
- * 2.5mg 1天1次，再使用1星期，病人適應良好下增加至
- * 3.75mg 1天1次，再使用1星期，病人適應良好下增加至
- * 5mg 1天1次，再使用4星期，病人適應良好下增加至
- * 7.5mg 1天1次，再使用4星期，病人適應良好下增加至
- * 10mg 1天1次，作持續性治療。

起始劑量由1.25mg開始，病人應該觀察約4小時（尤其注意血壓，心跳速率，傳導障礙，心衰竭惡化症狀），最大建議劑量是10mg 1天1次。

給藥方式

於早上餐前或餐後給藥皆可。請伴隨液體吞服，不要嚼碎。

三、使用時我該注意的特別事項？

使用於下列情況時應特別小心：

- 血糖值變化波動很大的糖尿病病人：須注意血糖明顯下降（低血糖）的症狀例如，心悸過速、心悸或出汗等可能會被遮蔽。
- 在嚴格的禁食狀態下。
- 正在接受減敏（desensitisation）療法。
- 有輕微的房室傳導障礙（第一級房室傳導阻斷）。
- Prinzmetal 氏心絞痛；已觀察到冠狀血管痙攣的病例。儘管是高度 β_1 選擇性，但當病人有 Prinzmetal 氏心絞痛並給予 bisoprolol fumarate 治療時，心絞痛發作無法完全被排除掉。必須

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DA15400201

學 名：Bisoprolol

商品名：BISOPROLOL (concor) 1.25MG

中文名：康肯膜衣錠1.25公絲



非常謹慎。

- 週邊動脈血管閉塞疾病（開始使用本藥治療時，症狀可能會變明顯）。

- 病人有或曾有牛皮癬之病史

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

倦怠、眩暈、輕微頭疼、出汗、間歇性跛行或Raynaud氏疾病之加重及四肢感覺異常、偶見血壓及脈搏速率之顯著降低或房室傳導之障礙。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於 25° C 以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師