

用藥指導單張

衛教小組 DA9900101

學名：Clopidogrel

商品名：CLOPIDOGREL ★ F.C. 75MG

中文名：舒栓寧膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

1. 降低近期發生中風、心肌梗塞或周邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化病人之粥狀動脈栓塞事件(如：心肌梗塞、中風或其他因血管病變引起的死亡)的發生。
2. 與 aspirin 併用降低非 ST 段上升之急性冠心症（不穩定性心絞痛和非 Q 波型心肌梗塞）病人（包括經皮冠狀動脈介入性治療後放置支架的患者）之粥狀動脈栓塞事件。
3. 與 aspirin 併用可用於以內科治療的 ST 段上升之急性心肌梗塞病人。
4. 不適合接受 Vitamin K antagonists 的心房纖維顫動患者，併有至少一個發生血管事件危險因子，且屬於出血危險性低者，可與 aspirin 併用以預防粥狀動脈栓塞及血栓栓塞事件，包括中風。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Clopidogrel 的建議劑量為每天 75mg，一天一次，可和食物同時服用或分開服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 若病人選擇手術治療並且不希望在手術期間有抗血小板作用，應於手術進行前 7 天停止使用 clopidogrel。在進行任何手術或增加其他新的藥品前，病人應告知醫師或牙醫師目前有服用 clopidogrel。Clopidogrel 會延長出血時間，應小心使用於有出血傾向的病人（特別是有潛在性胃腸道和眼內出血的病人）。
2. 服用 clopidogrel（無論是單獨服用或和 aspirin 併用）的病人應被告知當受傷時，傷口止血所需要的時間可能會比平常更長一些，若發現任何不正常出血狀況時，應立即看醫師。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

出血。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DA9900101

學名：Clopidogrel

商品名：CLOPIDOGREL ★ F.C. 75MG

中文名：舒栓寧膜衣錠



六、此藥儲存時的條件為何？

請貯存於 25° C 以下，並儲放在原包裝內。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師