


用藥指導單張

衛教小組 DC2460101

學名：Oxycodone

商品名：oxyCONTIN CR ★ 10MG(管藥二)

中文名：疼始康定持續藥效錠



一、此藥品的用途是什麼？

1. 需要長期疼痛控制之中重度癌症疼痛病患。
2. 需要長期疼痛控制之慢性中重度非癌症疼痛病患，且曾經接受過類鴉片藥物而無法有效控制疼痛者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

以疼始康定作為第一種類鴉片止痛藥

初始治療應為以每 12 小時一次、每次一顆 10 mg 藥錠的方式使用。

由其他口服可待因酮配方改用疼始康定

接受其他口服可待因酮配方的病患改用疼始康定時，應依據每12小時一次、每次二分之一當前口服可待因酮總劑量的方式使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 服藥後，請勿開車或操作危險機械及從事需要集中注意力的工作。
2. 一次僅服用一顆藥錠。
3. 用藥期間，請勿喝酒精性飲料。
4. 請搭配足量的開水服用藥錠，使藥錠放入口中後，請立即吞下。
5. 將藥錠放入口中前，請勿以浸泡、舔舐或以任何方式將藥錠弄濕。
6. 疼始康定經過特殊設計，必須完整吞下才可正確發揮作用。將藥錠切開、剝開、咀嚼、敲碎或溶解後，將可能導致用藥過量，此問題足以致命。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

便秘、噁心、嗜睡、暈眩、搔癢、嘔吐。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DC2460101

學名：Oxycodone

商品名：oxyCONTIN CR ★ 10MG (管藥二)

中文名：疼始康定持續藥效錠



六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師