用藥指導單張

衛教小組 DN14770101

學　名：Tetanus toxoid

商品名：ADSORBED TETANUS VACCINE B.P. 0.5ML(T.T)

中文名：吸著破傷風類毒素疫苗



一、此藥品的用途是什麼？

預防破傷風。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

肌　注射，每劑0.5毫升。

1.受傷後的疫苗接種依照衛　主管機關公告傷　處理原則之破傷風預防相關指引使　本疫苗。若不清楚過往破傷風類毒素疫苗接種史、未曾接受完整的破傷風類毒素疫苗基礎接種、雖已完成破傷風類毒素疫苗基礎接種，但前　劑破傷風類毒素疫苗已超過10年(　型　乾淨的傷　)或已超過5年(其他類型之傷　)，可立即給予0.5mL吸著破傷風類毒素疫苗。

2.接種方法使　前請搖勻。

破傷風類毒素疫苗應以肌　注射　式施打。疫苗應在使　前充分搖動，並只能使無菌針頭和注射器施打疫苗。破傷風類毒素疫苗外觀為灰　　懸浮液，接種前請先以　視觀察確認沒有異常的混濁、呈　、異物和其他的異常。若發現懸浮液變　或有　異物，請丟棄。未使　的疫苗與廢棄物應依當地法規丟棄。

三、使用時我該注意的特別事項？

當　母，監護　或成　疫苗接種者隨疫苗接種流程返回醫療院所進下　針注射時，執業　員必須在施打前針對先前注射該疫苗後的任何不適或反應症狀詳加詢問，並做出合適判斷及處理。

與使　所有疫苗　樣，疫苗接種者施打疫苗後應持續觀察30分鐘以上，以利在發　即時或早期過敏反應時給予合適處置。疫苗接種地點應隨時備妥適當的醫療與監測設施，以適當處理注射疫　苗過程中任何急性過敏反應。　應特別注意施打過程，確保注射疫苗不會進入　管　。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

根據於孕婦注射的臨床試驗以及含本成分的多合　疫苗　於孩童之臨床試驗，觀察到施打後注射部位局部反應常　為紅、腫、疼痛，全　性反應為短暫發燒、不適、煩躁感、紅疹、搔癢與暈眩。　多數反應輕微且可　　緩解。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11

用藥指導單張

衛教小組 DN14770101

學　名：Tetanus toxoid

商品名：ADSORBED TETANUS VACCINE B.P. 0.5ML(T.T)

中文名：吸著破傷風類毒素疫苗



已施　多次免疫接種的疫苗接種者可能會對再次疫苗接種產　較強的反應。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 疫苗應避光儲存於2℃　8℃之乾燥環境，　運輸過程也應保持於2℃　8℃。
2. 禁　冷凍保存，冷凍後的產品必須丟棄。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11