

用藥指導單張

衛教小組 DM12390101

學名：Terlipressin

商品名：TERLISSIN 1MG

中文名：坦沛思凍晶注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

出血性食道靜脈曲張、第一型肝腎症候群。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

靜脈注射

出血性食道靜脈曲張

每四小時，2mg靜脈注射直到出血開始受到控制，最多可使用到48小時。體重小於50公斤之病患注射劑量降到 1 mg。維持劑量(如果需要時)，每四小時注射 1mg，最多可使用三天。治療期間不可超過五天。

第一型肝腎症候群

每 24小時3~4mg分成 3或 4次投予。如果在三天治療後仍沒有出現血清中肌酸酐下降，建議停止 Terlissin 的治療。在另一種狀況下，血清肌酸酐下降，Terlissin 的治療需持續直到獲得血清肌酸酐的值小於 $130 \mu\text{mole} / \text{liter}$ 或是血清肌酸酐的值下降到至少比當時診斷肝腎症候群測量值少30%。標準平均治療期間是 10天。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. Terlipressin必須謹慎的以靜脈投予。溢漏到血管外可能引起皮膚壞疽。
2. 必須持續及嚴密的監測心跳速律和血壓。
3. 假使治療持續好幾天，必須監測尿量及血液電解質。
4. 為了確認第一型肝腎症候群的診斷，下列事項必須考慮去排除腎小管病變。腎小球的過濾下降，同時地肌酸酐的清除率小於 $40\text{ml}/\text{min}$ 或血清肌酸酐大於 $130 \mu\text{mol}/\text{l}$ 。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

肢端發紺；腹部痙攣，腹瀉；頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 不可超過 25°C ，避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM12390101

學名：Terlipressin

商品名：TERLISSIN 1MG

中文名：坦沛思凍晶注射劑

2. 混合溶解後的terlipressin注射溶液需立即使用。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師