用藥指導單張

衛教小組 DB10480101

學　名：Procaterol

商品名：EXDILA LIQUID 60ML

中文名：喘解液



一、此藥品的用途是什麼？

支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 通常成人：1 回10 毫升(相當Procaterol HCl 50μg)，1 日1 回，睡前服用；或1 日2 回，早晨及睡前各服用10 毫升。
2. 6 歲以上的孩童：1 回5 毫升(Procaterol HCl 25μg)，1 日1 回，睡前服用；或1 日2 回，早晨及睡前各服用5 毫升。
3. 未滿6 歲的孩童：1 回0.25 毫升/公斤(Procaterol HCl 1.25μg)，1 日2 回，早晨及睡前各服用1 回或1 日3 回，早、晚睡前各服用1 回。
4. 得依年齡及症狀適當增減。未滿6 歲的孩童1 回標準量如下：

未滿1 歲：2~3 毫升（Procaterol HCl 10~15μg）

1~3 歲：3~4 毫升（Procaterol HCl 15~20μg）

3~6 歲：4~5 毫升（Procaterol HCl 20~25μg）

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 甲狀腺機能亢進、高血壓、心疾患、糖尿病患者、孕婦宜慎重投與本劑。
2. 本劑與Epinephrine，Isoproterenol，Catecholamine 併用引起不整脈，應避免併用。
3. 本劑對Allergen 引起的皮膚反應有抑制作用，欲實施皮膚試驗時，須在12 小時前停藥。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

偶有心悸亢進、顏面潮紅、耳鳴、頭痛、胃部不適、口渴、全身倦怠、皮疹等現象。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03

用藥指導單張

衛教小組 DB10480101

學　名：Procaterol

商品名：EXDILA LIQUID 60ML

中文名：喘解液



25℃ 以下，無須冰存並避免陽光直射。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03