用藥指導單張

衛教小組 DQ1110201

學　名：Afatinib

商品名：giotrif ★ 30mg(低劑量)

中文名：妥復克膜衣錠

一、此藥品的用途是什麼？

1.GIOTRIF 適用於具有 EGFR-TK 突變之局部晚期或轉移性之非小細胞肺癌(NSCLC)患者之第一線治療。

2.GIOTRIF 適用於在含鉑類化學治療期間或之後惡化的局部晚期或轉移性之鱗狀組織非小細胞肺癌(NSCLC)患者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
作為第一線治療，即用於先前未曾接受 EGFR-酪胺酸激酶抑制劑(EGFR-TKI)治療的病人時，GIOTRIF 的建議劑量為 40 mg 口服，一天一次。

用於先前曾接受過第一線含鉑類療法之鱗狀組織非小細胞肺癌病人時，GIOTRIF 的建議劑量為 40 mg 口服，一天一次。

GIOTRIF 不可與食物同時服用。不可在服用 GIOTRIF 之前至少 3 小時內與之後至少 1 小時內進食[請參閱「臨床藥理學」]。錠劑應配以開水整粒吞服。

GIOTRIF 治療應持續至疾病惡化，或直到病人無法再耐受。

其他用法
若無法吞服整粒錠劑，可將GIOTRIF錠劑放入約100 mL飲用水(非碳酸類)中崩散，不可使用其他液體。將錠劑放入水中，不要壓碎，攪拌直到錠劑崩散成極小的顆粒(約 15 分鐘)後，立即喝下此溶液，再以約 100 mL 水沖洗杯緣並喝下。此溶液也可用鼻胃管餵食。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

腹瀉、皮疹。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.10.29

用藥指導單張

衛教小組 DQ1110201

學　名：Afatinib

商品名：giotrif ★ 30mg(低劑量)

中文名：妥復克膜衣錠

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存溫度請勿超過 30° C。請存放於原包裝中以避免受潮與光線照射。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.10.29