# 用藥指導單張

衛教小組 DM14910101

學　名：Amikacin

商品名：AMINFEC 250MG

中文名：安炎注射液



## 一、此藥品的用途是什麼？

革蘭氏陽性菌及陰性菌（包括綠膿感菌）所引起的感染症。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
1.肌注，靜注。2.成人和大一點的孩童—每天15mg/kg，分2～3次投(每天最大量1.5g)。3.新生兒—開始時10mg/kg，接著每12小時。7.5mg/kg。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

(1)凡有任何聽力改變、耳朵嗡嗡聲、頭暈、運動失調(2)當治療超過10天，一定要每天做腎功能和聽力或前庭功能的測試。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

## 五、此藥會造成什麼副作用？

(1)耳毒性反應、高頻率聽力喪失、失聰、耳鳴；(2)可逆性腎毒性反應、腎小管壞死、氮質血症、小便量少、頻尿、血尿；(3)肝毒性、噁心、嘔吐(4)嗜睡、步伐不穩、感覺異常。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.13