
用藥指導單張

衛教小組 DM4200101

學　名：Allopurinol

商品名：urINOL 100MG

中文名：威寧疼錠



一、此藥品的用途是什麼？

痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

抗痛風劑

初劑量：口服100mg，一天一次，在一星期的間隔期間每天增加100mg直到達到所需要的血清尿酸濃度為止。不得超過每日800mg之最大建議劑量。維持劑量：口服100至200mg，一天二至三次。在適度嚴重沙石痛風者的一般維持劑量為每天400至600mg。

贅瘤疾病

治療初始劑量：口服，在化學治療或放射治療開始之前的12小時到3天(最好是2至3天)，每天600mg至800mg。維持劑量：劑量必須要依據在Allopurinol治療開始後的48小時及其後的定期時間所執行之血清尿酸設定為基礎。

抗尿酸結石

口服100至200mg，每天一次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. Allopurinol可在飯後服用，以減輕胃腸道刺激。
2. 每日劑量可以分割的劑量或當作單一的劑量服用。每一個單一劑量，都必須不得超過300mg。超出300mg要求的每日劑量，必須要分割劑量使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

皮疹、搔癢。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫15～30℃保存，避光及受潮。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11