用藥指導單張

衛教小組 DJ16650101

學　名：Pneumococcal 20-valent conjugate vaccine

商品名：PREVENAR 二十價(公費)

中文名：沛兒肺炎鏈球菌二十價結合型疫苗



一、此藥品的用途是什麼？

預防肺炎鏈球菌感染。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
僅供肌肉注射使用。

Prevenar 20的劑量（0.5 mL）應以肌肉注射方式接種。嬰兒最好在大腿前外側（股外側肌，vastus lateralis muscle）接種，兒童和成人最好在上臂三角肌接種，注意避免注射到神經和血管中或附近。 Prevenar 20不可以靜脈輸注方式投予。

三、使用時我該注意的特別事項？

過敏

如同所有注射的疫苗一樣，應事先準備好適當的醫療治療和措施，以因應在接種疫苗後發生罕見的嚴重過敏事件。（請參閱第8節）。

同時患有其他疾病

發生急性嚴重發燒疾病的病人應延後接種。若是輕微感染如感冒時，不須因而延後接種疫苗。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

注射部位紅腫、疼痛、暫時性發燒、倦怠等。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於2 ~ 8℃（冷藏貯存）。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11