

用藥指導單張

衛教小組 DM13200201

學名：Prednisolone

商品名：predniSOLONE 5MG

中文名：普列道寧錠



一、此藥品的用途是什麼？

癭麻質斯性關節炎、脊椎炎、風濕痛、皮膚炎、支氣管性氣喘、過敏性疾患。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

通常成人1日三次。1次一片，視症狀與年齡酌量增減。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 酒精或其他抗炎劑和本藥共用會增加潰瘍的形成。
2. Amphotericin B或耗鉀利尿劑和本藥共用會增加低鉀血症，所以病人須時常測定血清中鉀的濃度。
3. 口服抗凝血劑和本藥共用可能會增加或減少其效應，所以投用本藥期間或其後須調整其使用劑量，此外，本藥所造成之胃腸潰瘍和出血亦會增加抗凝血劑治療病人的危險性。
4. 強心苷和本藥合用會增加心律不整的可能性或增加與低鉀血症相關之毛地黃毒性。
5. 本藥和Ephedrine合用會增加本藥的代謝清除率。
6. 本藥和Phenobarbital或Phenytoin或Rifampin合用，因為肝酶的誘生所以會增加本藥的代謝清除率。
7. Heparin和本藥共用，本藥所引起之胃腸潰瘍和出血症狀會對抗凝血劑治療的病人增加危險性。
8. 本藥因其內在性血糖增高效應會增加血糖值，所以在接受本藥治療期間及其後若服用降血糖藥物，須調整劑量。
9. 水楊酸與本藥共用時，血漿Salicylate濃度降低，需要較大劑量之Salicylates，此後若本藥停用或減低劑量時便會產生水楊酸中毒。
10. 本藥若服用劑量超過每平方公尺體表面積2.5~3.75mg時，會抑制Somatropin的反應。
11. 投用本藥時血糖值、尿中葡萄糖、血清鈉、血清膽固醇均可能增加而干擾診斷結果。
12. 投用本藥時血清鈣、血清鉀、血清蛋白結合碘(PBI)及血清甲狀腺素(T4)、甲狀腺¹³¹I的攝取以及尿中17-Hydroxy-steroid(17-OHCS)和尿中17-Ketosteroid(17-KS)均會減低，而干擾診斷結果。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM13200201

學名：Prednisolone

商品名：predniSOLONE 5MG

中文名：普列道寧錠



四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 投用本藥如有視覺減退、模糊、頻尿、易渴(糖尿)，皮膚紅疹(過敏反應)，等副作用時，應予醫療照顧。
2. 長期投用本藥期中若有下列副作用，亦應給予醫療照顧：粉刺或其他皮膚問題；背或肋骨痛(鬆骨病)；便血(胃腸出血)；感染的敏感性增加；傷口不易癒合；不規則心跳、肌肉痙攣或痛、異常的疲倦衰弱(鉀減失)；月經不順(內分泌不平衡)；精神鬱悶、情緒改變(精神性病變)；圓月臉(Cushing綜合性)；肌肉無力(類固醇肌病)；噁心或嘔吐(胰臟炎)；看見光圈圍繞燈光(青光眼)；持續性胃痛或不適(消化性潰瘍，胰臟炎)；下肢腫大(鈉滯留)或結核病的再活化等。
3. 投用本藥如有消化不良、虛偽愉快感、食慾增加、神經過敏、不寧、睡眠不適、體重增加等副作用持續時應予醫療照顧。

六、此藥儲存時的條件為何？

25°C 以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師