用藥指導單張

衛教小組 DA1820101

學　名：Nicametate citrate

商品名：sanYL 50MG

中文名：暢力糖衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

末梢血管循環障礙。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
通常成人每次1-2錠，一日3次，飯後服用，最好連續服用10~20天

三、使用時我該注意的特別事項？

1.高齡使用時，因其生理機能降低，應減量使用之。2.懷孕婦女使用時，關於妊娠中的投與之安全性尚未完全確立，所以對孕婦或有可能懷孕的婦人，只有在治療上的有效性高於危險性時才投與。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

偶有噁心、腹痛、腹部膨脹感、心悸亢進、顏面潮紅、發疹

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.25