
用藥指導單張

衛教小組 DA2040101

學　名：Ramipril

商品名：TRITACE 10MG

中文名：心達舒錠



一、此藥品的用途是什麼？

高血壓。

心肌梗塞後的心衰竭。

降低因心血管疾病導致之心肌梗塞，中風及死亡的危險。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

用量

依病人對該藥的容忍度及欲達到的作用調整劑量。Tritace 通常是長期服用；醫師個別決定每位病人的治療期。

高血壓的治療

每日推薦起始劑量 2.5mg，視對藥物反應而定，可以增加劑量，每次增量應投予雙倍劑量，間隔 2-3 週。維持劑量通常為每日 2.5-5mg，每日最高劑量為 10mg。

鬱血性心衰竭的治療

每日推薦起始劑量為 1.25mg，視用藥反應而定，可以增加劑量。每一次增量應為雙倍劑量，間隔 1-2 週。每日最高劑量為 10mg。每日需要量若等於或多於 2.5mg，可以一次服用或分二次服用。

心肌梗塞後的治療

每日推薦起始劑量為 5mg，分 2 次服用，每次 2.5mg，早上及晚上各一顆。若無法忍受此劑量，前 2 日應以每日 2 次，每次 1.25mg 服用。視用藥反應，可以增加劑量，每一次增量應投予雙倍劑量，間隔 1-3 天。若治療使病情獲得改善，則每日劑量可單次服用。每日最高劑量為 10mg。

對於心肌梗塞後立即引起的嚴重心衰竭(NYHA IV)的治療仍缺乏足夠的經驗。若給予治療，應以每日 1.25mg 開始，增加劑量時須特別留意。

心肌梗塞，中風或心血管死亡之預防

每日推薦起始劑量為 2.5mg，視病人的耐受性而定，可以逐漸增加劑量。劑量應於一週後增為雙倍量。三週後，應再倍增到一般的維持量 10mg。

用法

Tritace 的錠劑應以足量的液體（約半杯），整顆吞服，勿咬碎，可於飯前，飯間或飯後服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03


用藥指導單張

衛教小組 DA2040101

學　名：Ramipril

商品名：TRITACE 10MG

中文名：心達舒錠



1. 患以下嚴重疾病病人使用本品須調整劑量，並小心使用：腎機能不足、心衰竭、雙側腎動脈狹窄、具單腎病人且合併腎動脈狹窄、肝功能不全、患自體免疫疾病(如：白血球減少症已出現腎功能不全及膠質變性)，體液及鹽份嚴重流失病人(如：症狀性低血壓)。
2. 尚未建立兒童劑量，故兒童不宜使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

少數病人會有眩暈、嘔吐、腹痛、下痢、咳嗽、搔癢等現象。

六、此藥儲存時的條件為何？

請勿儲存超過 30℃。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03