

用藥指導單張

衛教小組 DQ12400101

學名：Pemetrexed

商品名：pemedax ★ 100mg(低劑量)

中文名：好佑得凍晶注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. Pemetrexed 併用 cisplatin 是治療局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(顯著鱗狀細胞組織型除外)之第一線化療用藥。
2. Pemetrexed 單一藥物是局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(顯著鱗狀細胞組織型除外)病人接受4 個週期含鉑藥物的第一線化療後疾病並未惡化之維持療法。
3. Pemetrexed 單一藥物是治療局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(顯著鱗狀細胞組織型除外)之第二線治療用藥。
4. Pemetrexed 與cisplatin 併用於治療惡性肋膜間質細胞瘤。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Pemetrexed 僅供靜脈輸注。

1. 併用 Cisplatin 治療非小細胞肺癌及惡性肋膜間質細胞瘤Pemetrexed 之建議劑量為 500mg/m²，於 21 天週期的第1 天，以靜脈輸注方式投與 10分鐘，cisplatin之建議劑量為 75mg/m²，於 Pemetrexed 輸注結束後約30分鐘，以靜脈輸注方式投與 2小時。
2. 使用單一藥物作為第一線治療後的維持治療，或作為第二線治療 Pemetrexed 之建議劑量為 500mg/m²，於 21 天週期的第1 天，以靜脈輸注方式投與10 分鐘以上。

3. 治療前給藥與同時給藥維生素補充劑從投與第一劑Pemetrexed 的前7天開始，指示病患開始每日口服一次 400mcg到1000mcg的葉酸。在整個 Pemetrexed 療程中需持續服用葉酸，直到最後一劑Pemetrexed 投藥後 21 天為止。

投與第一劑 Pemetrexed 的前1週，以肌肉注射的方式投與 1 mg 維生素 B12，之後每3個週期投與一次。隨後的維生素 B12可在 Pemetrexed 療程當天進行注射。

Corticosteroid

Dexamethasone 4mg以口服方式一天二次投與，給藥時間包括 Pemetrexed 投藥前一天、當天及後一天。

三、使用時我該注意的特別事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ12400101

學名：Pemetrexed

商品名：pemedra ★ 100mg(低劑量)

中文名：好佑得凍晶注射劑



進行 Pemetrexed 治療前，開始補充口服葉酸與肌肉注射之維生素 B12，以降低 Pemetrexed 的血液及胃腸道毒性之嚴重性。肌肉注射之維生素 B12 不得以口服取代。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

疲勞、噁心及食慾缺乏。

六、此藥儲存時的條件為何？

本藥品應儲存於 25℃ 以下，允許的短暫儲存條件為 15– 30℃。調配與稀釋後之 Pemetrexed 溶液，在儲存條件為冷藏 2–8℃，其物化安定性已證實可達 24 小時，時間由開始調配計算。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師