

用藥指導單張

衛教小組 DQ13650101

學名：Vinorelbine

商品名：vinobin ★ 20mg(低劑量)

中文名：威若賓軟膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

1. 非小細胞肺癌。
2. 轉移性乳癌。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

僅用於口服

Vinorelbine 軟膠囊必須在用餐時以水整顆吞服(不可嚼食或剝開膠囊)。

Vinorelbine 軟膠囊僅用於單一化學療法。

建議劑量：前三次：依體表面積每週給藥60mg/m²一次。

第四次開始：增加為每週給藥80mg/m²一次，除非在前三次服用60mg/m²時，病人的嗜中性白血球數目曾低於500/mm³或曾經一次以上嗜中性白血球數目介於500~1000/mm³之間。在每週給藥80mg/m²用量的治療期間，若病人的嗜中性白血球數目低於500/mm³或曾經一次以上嗜中性白血球數目介於500~1000/mm³之間，治療時間必須暫緩到數目回復正常值，同時必須降低劑量至每週60mg/m²。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 若病人不慎嚼食或咬破膠囊，請使用大量清水漱口或用生理食鹽水更佳。如果膠囊破損，膠囊內含有刺激性的液體可能會在接觸到皮膚、黏膜或眼睛時造成傷害。破損的膠囊絕對不可吞食，必須退還給醫師並以正確的方法予以銷毀。如不慎接觸到，請立刻以清水小心沖洗，或以生理食鹽水沖洗更佳。如在服藥後數小時有嘔吐的情形發生，勿重複投予此劑量並可給予如5HT₃拮抗劑setron（如ondansetron、granisetron），降低嘔吐的發生。
2. 因本藥含有山梨醇，對果糖無耐受性者不可服用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

骨髓抑制，主要導致嗜中性白血球減少症、感覺神經障礙、噁心、嘔吐、體重下降、疲勞、倦怠。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ13650101

學名：Vinorelbine

商品名：vinobin ★ 20mg(低劑量)

中文名：威若賓軟膠囊

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於2~8℃。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師