

用藥指導單張

衛教小組 DE9970201

學名：Empagliflozin+Linagliptin

商品名：GLYXAMBI F.C 25/5MG

中文名：糖順平膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

GLYXAMBI 錠劑適用於配合飲食控制及運動，以改善下列第二型糖尿病人者的血糖控制：使用metformin合併empagliflozin或linagliptin未能達到適當血糖控制者；或已在服用empagliflozin及linagliptin合併治療者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

GLYXAMBI 的建議劑量為每日早上一次、每次 10mg empagliflozin/5mg linagliptin，可與食物一起服用，亦可空腹服用。

GLYXAMBI 耐受良好的病人，劑量可增加至每日一次 25 mg empagliflozin/5 mg linagliptin。

腎功能不全病人

開始使用 GLYXAMBI 前建議先評估腎功能，並於之後定期評估。

腎絲球過濾率估計值(eGFR) 低於30 mL/min/1.73 m²的病人，不應使用GLYXAMBI。

腎絲球過濾率估計值大於或等於30 mL/min/1.73 m²的病人，無須調整劑量。

若腎絲球過濾率估計值持續低於30 mL/min/1.73 m²，應停用GLYXAMBI。

三、使用時我該注意的特別事項？

linagliptin 的上市後報告，曾發生急性胰臟炎的病例，包括致命的胰臟炎。請特別注意胰臟炎的可能徵象和症狀。若懷疑出現胰臟炎，請立即停止使用 GLYXAMBI 並開始給予適當的治療。目前仍不瞭解有胰臟炎病史之病人使用 GLYXAMBI，是否會增加發生胰臟炎的風險。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

泌尿道感染、鼻咽炎、上呼吸道感染。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於 30° C 以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師