用藥指導單張

衛教小組 DC10540101

學　名：Tramadol+Acetaminophen

商品名：UTRAPHEN★37.5MG/325MG(管藥四)

中文名：立除痛膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

劑量－成人及16歲（含）以上兒童

本品最大單次劑量為每四至六小時服用一至兩錠，視需要減輕疼痛，一天最多服用八錠。

口服使用，可與食物併服或不與食物併服。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 應謹慎使用於未滿12歲兒童，當臨床效益大於風險時，方可考慮使用。應謹慎使用於未滿18歲之扁桃腺及腺樣體切除術後止痛。應謹慎使用於肥胖、具有阻塞型睡眠呼吸中止症、嚴重肺部疾病等情形之病人，因可能增加嚴重呼吸問題之風險。用藥期間不建議哺乳，因可能對哺餵之嬰兒產生嚴重不良反應，包括：異常嗜睡、哺乳困難或嚴重呼吸問題。

2. 本品可能會減弱病人從事有潛在危險的工作（如駕車或操作機械）所需的心智或生理能力。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常被報告的不良反應為噁心、暈眩及嗜眠。

六、此藥儲存時的條件為何？

貯於25℃。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.10