

用藥指導單張

衛教小組 DL14260101

學名：Quetiapine

商品名：queLIP XR TAB 200MG

中文名：潰益平持續性藥效膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療思覺失調症、雙極性疾患之鬱症發作、躁症發作及混合性發作。對於抗鬱劑單一藥物治療效果不佳的重鬱症(MDD)病人，可作為重鬱症發作的附加治療。在開始治療之前，臨床醫師應該考慮Quetiapine XR的安全性。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Quetiapine XR 宜空腹服用或與清淡食物(約 300 大卡)併服。

思覺失調症

急性治療劑量 Quetiapine XR 應每天服用一次，晚上服用較佳。建議起始劑量是每天 300 mg。應依病人的臨床反應及對藥物的耐受性，將劑量調整至每天 400-800 mg 的範圍內。

劑量增加的間隔最短是一天，增加幅度最多每天 300 mg。超過每天 800 mg 劑量的安全性尚未在臨床試驗進行評估。

雙極性疾患

雙極性疾患的鬱症發作

急性治療一般劑量 Quetiapine XR 應每天晚上服用一次，到第四天達到每天 300 mg。

雙極性疾患的躁症發作/混合發作

急性單一藥物治療或輔助治療(配合鋰鹽或 divalproex)的一般劑量 Quetiapine XR 應每天服用一次，晚上服用較佳。第一天 300 mg，第二天 600 mg。從第三天開始可視個別病人的臨床反應和耐受性，在每天 400-800 mg 的劑量範圍內重新調整 Quetiapine XR 的劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DL14260101

學名：Quetiapine

商品名：queLIP XR TAB 200MG

中文名：潰益平持續性藥效膜衣錠



五、此藥會造成什麼副作用？

嗜睡、頭暈、口乾。

六、此藥儲存時的條件為何？

於 30°C (77°F) 以下於原包裝中儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師