用藥指導單張

衛教小組 DB8780301

學　名：Ephedrine

商品名：EPHEDRINE ★ 40MG 1ML

中文名：鹽酸麻黃素針



一、此藥品的用途是什麼？

支氣管性氣喘、血管運動神經性鼻炎、過敏性鼻炎、脊椎麻醉導致之急性低血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一般成人劑量：

肌肉或皮下注射，25-50mg，必要時重複給藥。

靜脈注射，5-25mg緩慢注射，必要時5-10分鐘再注射一次。

一般成人處方限量：每24小時可達150mg。

一般兒童劑量：

肌肉或皮下注射，每公斤體重500mcg或每平方公尺體表面積16.7mg，每4-6小時一次。

三、使用時我該注意的特別事項？

本品可用於合成amphetamine，故其原料藥列為管制藥。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

副作用包括頭暈、頭痛、焦慮、不規律或加速心跳、失眠及血壓上昇等，長期使用可能會影響心臟功能。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03