
用藥指導單張

衛教小組 DC15150101

學　名：Escitalopram

商品名：LEEYO F.C. 10MG

中文名：離憂膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

憂鬱症之治療及預防復發。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
65歲以上老年人，肝功能有問題的病人，以及使用 omeprazole 或 cimetidine 等胃藥的病人 escitalopram 之建議每日最大劑量為 10 毫克 。

憂鬱症：常用劑量為每日 10毫克，依各別患者狀況，劑量可增加到最高每日 20毫克。產生抗抑鬱效果通常須 2 ~ 4 週，在症狀解除後，治療至少須持續 6個月以強化效果。每日劑量超過 20 毫克之安全性未被證實 Escitalopram 以每日單一劑量投予，單獨或與食物併服皆可。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本抗憂鬱藥物不應用於對於18 歲以下孩童及青少年的治療。 2. 有些伴有恐慌症之患者，在開始使用抗抑鬱藥時，可能會增強焦慮的症狀，這種自相矛盾的反應，通常在開始治療的前2週內就會消失。建議以低劑量開始投與，可降低矛盾焦慮作用的可能性。 3. 任何患者產生癲癇症狀時，本藥必須停用。

4. Escitalopram可能導致與劑量有關之QT interval 延長，每日劑量不得超過20毫克，有先天性QT間隔延長症候群者應避免服用 escitalopram，服用 escitalopram前須 先矯正低血鉀和低血鎂之狀況，且須定期檢測血液電解質濃度。應積極監測有同時服用其 他藥物而有較高 Torsades de poites風險患者的心電圖。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、失眠、嗜睡、疲勞。

六、此藥儲存時的條件為何？

避光，並於25℃以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.10