用藥指導單張

衛教小組 DM10000101

學　名：Tocilizumab

商品名：ACTEMRA（皮下）162MG/0.9ML FOR SC INJ.(健保事審)

中文名：安挺樂皮下注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. 類風濕性關節炎（RA）

Actemra 合併methotrexate（MTX）可用於治療成年人中度至重度類風濕性關節炎，曾使用一種或一種以上之DMARD 藥物治療或腫瘤壞死因子拮抗劑（TNF antagonist）治療而反應不佳或無法耐受的病人。在這些病人中，若病人對MTX無法耐受或不適合繼續投與MTX，可給予Actemra 單獨治療。

2. 巨細胞動脈炎（GCA）

Actemra適用於治療成人巨細胞動脈炎（GCA）

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一、 類風濕性關節炎

1. Actemra可單獨給藥，或與methotrexate 合併使用。
2. 本Actemra皮下注射劑只可皮下注射給藥。
3. 成人的建議劑量：體重少於100公斤病人，皮下注射162毫克每兩週一次，視臨床反應可增加至每週一次。體重等於或大於100公斤病人，皮下注射162毫克每週一次。

二、 巨細胞動脈炎

Actemra用於治療成人GCA病人時的建議劑量為162 毫克每週皮下注射一次，合併逐步減量的糖皮質激素。依據臨床考量，或可處方162 毫克每兩週皮下注射一次的劑量，合併逐步減量的糖皮質激素。

注射技巧方面的指示

使用之前，應先將預充針筒或預充針筒附注射筆自冰箱中取出，去除外盒後，在室溫下靜置30 分鐘，但要避免被兒童取得。切勿以任何其他方式為Actemra加溫。

三、使用時我該注意的特別事項？

建議所有病人，尤其是兒童或老年病人與全身性幼年型原發性關節炎（SJIA）病人，如果可能的話，在接受Actemra 治療之前應該先接種所有現行免疫接種指引所建議的疫苗。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

用藥指導單張

衛教小組 DM10000101

學　名：Tocilizumab

商品名：ACTEMRA（皮下）162MG/0.9ML FOR SC INJ.(健保事審)

中文名：安挺樂皮下注射劑



四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

最常出現的嚴重感染包括肺炎、泌尿道感染、蜂窩性組織炎、帶狀皰疹、腸胃炎、憩室炎、敗血症及細菌性關節炎。

六、此藥儲存時的條件為何？

Actemra必須儲存於2 至8°C，請勿冷凍保存。請將預充針筒或預充針筒附注射筆儲存於原包裝中，避免光照，於使用時再開啟，預充針筒附注射筆並應保持乾燥。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20