

用藥指導單張

衛教小組 DD12890101

學名：Terlipressin

商品名：TERLISSIN SOL'N 1MG(水溶液製劑)

中文名：坦沛思注射液



一、此藥品的用途是什麼？

出血性食道靜脈曲張，第一型肝腎症候群。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

出血性食道靜脈曲張：

成年人：

一開始每4 小時靜脈注射2 小瓶Terlipressin acetate 注射液（2 毫克Terlipressin acetate，相當於1.7 mg Terlipressin），直到出血獲得控制，最多可使用到48 小時。如果病人體重<50 公斤，可以將劑量調整為每4 小時靜脈注射1 小瓶Terlipressin acetate 注射液（1mg Terlipressin acetate，相當於0.85 mg Terlipressin）。維持劑量（如果需要時）是每4 小時注射1 小瓶Terlipressin acetate 注射液，最長3 天。

治療期間不能超過5 天。

對於第一型肝腎症候群：

每24 小時，3 到4 小瓶Terlipressin acetate 注射液（3到4mg Terlipressin acetate，相當於2.55 到3.4 mg Terlipressin），分成3 或4 次注射。如果治療3 天後血清肌酸酐（creatinine）沒有下降，建議要停止Terlipressin acetate治療。至於其他病例，則繼續Terlipressin acetate 治療，直到血清肌酸酐的數值低於 $130 \mu\text{mol/litre}$ ，或血清肌酸酐值與診斷為肝腎症候群時的數值相比下降至少30%為止。

標準平均治療期間是10 天。

三、使用時我該注意的特別事項？

治療期間要定期監測血壓、心電圖、心率、血清鈉、鉀和體液平衡。假使治療持續數天，必須監測尿量及血液電解質。為了避免注射部位局部壞死，一定要靜脈注射。

高血壓、已知有心臟病冠狀動脈功能不全、腎功能不全、腦血管或周圍血管疾病、呼吸衰竭的病人治療時要特別小心。

有缺血性心臟疾病史的病人應慎用，因terlipressin 可能引起缺血。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DD12890101

學名：Terlipressin

商品名：TERLISSIN SOL'N 1MG(水溶液製劑)

中文名：坦沛思注射液



五、此藥會造成什麼副作用？

蒼白、血壓升高、腹痛、噁心、腹瀉和頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

存放在冰箱（2℃～8℃）。

避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師