用藥指導單張

衛教小組 DA8110301

學　名：Tranexamic acid

商品名：TRANSAMIN ★ 250MG 5ML(注射)

中文名：斷血炎注射液



一、此藥品的用途是什麼？

紫斑病、白血病、肺結核之喀血、血痰、手術時之異常出血、腎出血。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
一般成人以Transamin注射液一日250-500mg，分1-2次靜脈或肌肉注射。手術中、手術後，必要時可以1次500-1000mg靜脈注射，或500-2500mg靜脈點滴注射。

三、使用時我該注意的特別事項？

下列患者請謹慎使用

1. 有血栓的患者及可能引起血栓的患者。
2. 消耗性血液凝固障礙的患者。
3. 曾對本劑有過敏的患者。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：　在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

偶有噁心、嘔吐現象。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.21