用藥指導單張

衛教小組 DQ7200101

學　名：Topotecan

商品名：HYCAMTIN ★ 4MG

中文名：癌康定注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. Topotecan 用於治療卵巢癌及小細胞肺癌之第二線化學治療(第一線化療應包括白金化合物)。

2. Topotecan 與 cisplatin 併用適用於治療經組織學檢查確定患有第IV-B期復發性或持續性子宮頸癌，且不適合以外科手術及(或)放射療法進行治療的患者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

卵巢癌及小細胞肺癌

建議劑量為每天1.5 mg/m2體表面積，連續5天以每日30分鐘靜脈輸注的方式給予，各療程間必須間隔3週。若耐受性良好，則除非疾病惡化，可持續進行治療。

子宮頸癌

建議劑量為每天0.75 mg/m2，於第1、2和第3天每天以30分鐘的靜脈輸注方式給藥。Cisplatin在第1天topotecan用藥後以靜脈輸注方式給予每天50 mg/m2的劑量。每21天重複此治療時間表，共進行6個療程或直到疾病惡化為止。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

血液及淋巴系統疾病

發熱性嗜中性白血球減少症、嗜中性白血球減少症、血小板減少症、貧血、白血球減少症。

腸胃道異常

噁心、嘔吐及腹瀉(三者均可能為重度)、便秘、腹痛及黏膜炎。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

用藥指導單張

衛教小組 DQ7200101

學　名：Topotecan

商品名：HYCAMTIN ★ 4MG

中文名：癌康定注射劑



皮膚和皮下組織異常
禿頭。

代謝及營養異常
厭食(可能為重度)。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於冰箱冷藏室2~8℃以下，不可冷凍 。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11