用藥指導單張

衛教小組 DA3040101

學　名：Amiodarone

商品名：ADARONE 200MG

中文名：艾達絡錠



一、此藥品的用途是什麼？

WOLFF-PARKINSON-WHITE氏症候群、上室性及心室性心博過速、心房樸動、心房纖維顫動、心室纖維顫動

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
口服：每天600mg，進餐時服用。一週後減為每天200～400mg，每月服藥20天維持劑量每天200mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

(1)心搏過慢者與房室傳導阻礙者不宜使用。(2)對碘過敏者，有甲狀腺疾病者亦宜避免使用。(3)服用本品時宜避免曬太陽。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 常見的-肌肉無力、疲憊、頭暈、低血壓、角膜褐黃色沈澱、厭食、噁心、嘔吐、便秘、光敏感。
2. 胃腸不適、頭痛、心搏過慢、關節痛、過敏反應、皮膚色素沈著，但停藥後會消失。
3. 嚴重的-心因性休克、心竇遏止、肝毒性、致命性喘息症候群(孩童IV投與)。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.06